

La Maladie Hémorragique Virale (VHD)



Maladie	Bactérienne <input type="checkbox"/>	Virale <input checked="" type="checkbox"/>	Parasitaire <input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>
Principales espèces animales touchées	Lapin			
Zoonose (transmissible à l'homme)	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	Maladie réglementée (déclaration obligatoire, mesures de police sanitaire)	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Résistance de l'agent contaminant	Dans le milieu naturel :	Très résistant dans le milieu extérieur (3 mois à température ambiante)		
	Au froid :	Résiste à la congélation		
	Au chaud :	Résiste 30mn à 60°C		
	Aux agents chimiques :	Sensible à une exposition prolongée (éther, chloroforme)		

DANS LA FAUNE SAUVAGE	
Maladie mortelle	Mortelle dans 50 à 90% des cas Particulièrement mortelle chez les juvéniles
Symptômes	Troubles nerveux, fièvre, difficultés respiratoires, spasmes, saignements de nez
Organes atteints	Nécrose du foie, grosse rate. Sont atteints également : poumons, reins...
Causes de la maladie	Virus de la famille des <i>Calicivirus</i> (genre <i>Lagovirus</i>) Virus très contagieux, les survivants contaminent les autres
Période(s) critique(s)	Sporadique toute l'année mais plus fréquent de septembre à décembre
Voies de contamination	Maladie très contagieuse qui se transmet par contact direct (voie oro-nasale) ou indirect (excréments, objets contaminés) avec un animal ou un cadavre contaminé, ou par ingestion d'aliments contaminés par les excréments
Prévention	Détruire les cadavres par incinération

Risque de passage animaux sauvages ↔ domestiques	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
	Voies de contamination	Ingestion d'aliments contaminés, contact avec un objet contaminé
	Espèces sensibles	Lapins
	Prévention	Vaccination
Risque de transmission aux chiens de chasse	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	
	Dangerosité	-
	Prévention	-

